STELLE

Le basi fisiche della struttura stellare
(lezione 1)

Ripassino di matematica: le derivate

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = I$$

RA PPORTO
INCREMENTALE

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (\Delta x \rightarrow 0)}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$$

DERIVATA

In sintesi la derivata di una funzione $f(x)$ descrive la rapidità della sua variazione al variare della variabile x .

Ad esempio la velocità è la derivata della posizione rispetto al tempo (esprime quanto rapidamente varia la posizione al trascorrere del tempo).

Allo stesso modo l'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo (esprime quanto rapidamente varia la velocità al trascorrere del tempo).

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

POSIZIONE X
MASSIMA
(DECELEERA, INVERTE)
(IL MOTO E TORNA
INDIETRO)
 $a = \frac{d^2x}{dt^2} < 0$

POSIZIONE X
MINIMA
(ACCELEERA, INVERTE)
(IL MOTO E RIPARTE IN)
AVANTI
 $a = \frac{d^2x}{dt^2} > 0$

POSIZIONE X = COSTANTE
(IL CORPO RESTA FERMO)
 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = 0$

$v = 0 \Rightarrow$ CORPO FERMO $\Rightarrow$
 $\frac{dx}{dt} = 0$

Questo vale per ogni grandezza fisica che varia nel tempo.

L'integrale

INTEGRALE = AREA

$$\int_a^b$$

$$f(x) dx$$

= AREA COMPRESA

TRA IL
GRAFICO E

CLASSE X (DA X=a AD X=b)

CALCOLO DELL'INTEGRALE:

SI RISALE DA UNA FUNZIONE $f(x)$
 ALLA SUA PRIMITIVA $F(x)$ TALE CHE $F'(x) = f(x)$

$$\int_{x_0}^{x_1} (x+2) dx =$$

$$= \frac{[(x_1+2) + (x_0+2)] \cdot (x_1 - x_0)}{2} =$$

$$= \frac{(x_1 + x_0)(x_1 - x_0)}{2} + \frac{2(x_1 - x_0)}{2} =$$

$$\approx \frac{x_1^2}{2} - \frac{x_0^2}{2} + 2x_1 - 2x_0 = \left[\frac{x^2}{2} + 2x \right]_{x_0}^{x_1} = \overset{\text{PRIMITIVA}}{F(x)} = F(x_1) - F(x_0)$$

$$F'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{x^2}{2} + 2x - \left(\frac{x_0^2}{2} + 2x_0\right)}{x - x_0} =$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{x^2 - x_0^2}{2} + 2(x - x_0)}{x - x_0} =$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cancel{(x - x_0)}(x + x_0)}{2\cancel{(x - x_0)}} + \frac{2\cancel{(x - x_0)}}{\cancel{x - x_0}} = \frac{x_0}{2} + 2$$

⇓

$$\frac{dF}{dx} = F'(x) = x + 2 = f(x)$$

Definizione di stella

E' una massa autogravitante di gas incandescente, in equilibrio e che ha attivi al suo interno meccanismi di produzione di energia.

Proprietà caratteristiche

- Una stella è fatta di gas: lo spettro di corpo nero del Sole e la sua analisi hanno rivelato come la sua temperatura superficiale sia tanto elevata da non consentire alcun altro stato di aggregazione della materia che quello gassoso.

La elevata temperatura del gas stellare rende trascurabili le interazioni tra le particelle del gas: il gas può essere considerato un “gas perfetto” (o “ideale”) e descritto fisicamente dall’equazione di stato dei gas perfetti

$$p \cdot V = nRT$$

(p = pressione, V = volume, T = temperatura assoluta, n = numero di moli, R = costante universale dei gas perfetti)

Prime leggi empiriche che descrivono il comportamento dei gas (le trasformazioni)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (T \text{ COSTANTE})$$

$$p = p_0 (1 + \alpha t) \quad (V \text{ COSTANTE})$$

$$V = V_0 (1 + \alpha t) \quad (p \text{ COSTANTE})$$

$$\alpha = \frac{1}{273^\circ \text{C}}$$

Dalle leggi empiriche all'equazione di stato (la temperatura assoluta o Kelvin)

$$p = p_0 \left(1 + \frac{t}{273}\right) = p_0 \left(\frac{273^\circ\text{C} + t}{273^\circ\text{C}}\right)$$

$$p = p_0 \frac{T}{T_0} \quad T_0 \leftarrow 0 \text{ ASSOLUTO (KELVIN)}$$

$$V \text{ COSTANTE} \Rightarrow \frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_0}$$

$$p \text{ COSTANTE} \Rightarrow \frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0}$$

$$T \text{ COSTANTE} \Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$\Rightarrow \frac{p \cdot V}{T} = \text{cost}$$

Gas “perfetti” ...

$$p \cdot V = n R T$$

n = numero di moli

$$R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mole} \cdot \text{K}}$$

E gas “reali”

$$\left(p + \frac{m^2 a}{V^2} \right) (V - mb) = n R T$$

EQUAZIONE DI VAN DER
WAALS

Il modello del gas “perfetto” o “ideale” è un modello valido per descrivere il gas stellare in quanto quest'ultimo ha:

- 1) bassa densità (i suoi costituenti elementari hanno distanze molto maggiori delle loro dimensioni)
- 2) elevata temperatura (la pressione è determinata essenzialmente dall'energia cinetica molecolare e non dalla repulsione degli involucri molecolari)

Sulla natura atomica dei gas: la teoria cinetica

Quantità di moto ceduta ad una parete per ogni urto (III legge della dinamica)

$$\Delta v_x = -v_x - v_x$$

$\Rightarrow$

$$\Delta v_x = -2v_x$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\leftarrow \Delta p_x = -2mv_x$$

$$\rightarrow \Delta p = -\Delta p_x = 2mV$$

CONTRO
LA PARETE

STATISTICA DI BOLTZMANN

DISTRIBUZIONE ISOTROPA DELLE VELOCITÀ

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

tutte le particelle che muovendosi a velocità v urtano contro la parete nel tempo Δt

m = DENSITÀ VOLUMETRICA DEI CORPUSCOLI

$$m = \frac{N}{V} \left(\frac{\text{NUMERO}}{\text{VOLUME}} \right)$$

$v_x \cdot \Delta t$

$$N = m \cdot V = m \cdot v_x \cdot \Delta t \cdot A$$

NUMERO DI CORPUSCOLI

(AREA DELLA PARETE)

CHE URTANO LA PARETE

NEL TEMPO Δt .

(NUMERO URTI IN Δt)

POICHÉ OGNIUNA TRASFERISCE ALLA
PARETE UNA QUANTITÀ DI MOTO $2mV_x$
AD OGNI URTO

NEL TEMPO Δt ALLA PARETE
VIENE TRASFERITA QUANTITÀ DI
MOTO COMPLESSIVA

$$\Delta p = 2 \cdot m \cdot V_x \cdot m \cdot V_x \cdot \Delta t$$

POICHÉ LA FORZA PER IL II^o
PRINCIPIO DELLA DINAMICA È

$$\vec{F} = m \cdot a = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = \left(m \frac{dv}{dt} \right)$$

CIÒ È $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$

LA FORZA D'URTO DELLE
PARTICELLE CONTRO LA PARETE

È

$$F = \frac{2 m n \langle v^2 \rangle}{6}$$

← MA PERCHÉ
6?

Visto che le particelle di un gas sono tante (ma tante!) si considera una media statistica

$$\langle v \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N v_i}{N} = \frac{\int_0^{+\infty} v f(v) dv}{\int_0^{+\infty} f(v) dv = 1} \quad (\text{MEDIA})$$

$$\langle v^2 \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N v_i^2}{N} = \frac{\int_0^{+\infty} v^2 f(v) dv}{\int_0^{+\infty} f(v) dv = 1} \quad (\text{MEDIA QUADRATICA})$$

LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
E DI VELOCITÀ DELLE PARTICELLE
È OMOGENEA E ISOTROPA

(IPOTESI DELLA STATISTICA D1)
L. BOLTZMANN

$$\begin{aligned}\langle v_x^2 \rangle &= \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle \\ \langle v^2 \rangle &= \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \\ \langle v^2 \rangle &= 3 \langle v_x^2 \rangle \\ \Downarrow \\ \langle v_x^2 \rangle &= \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle\end{aligned}$$

LE PARTICELLE
HANNO LA STESSA
PROBABILITÀ DI
MUOVERSI IN ENTRAMBI
I VERSI

QUINDI CONTRO LA
STESSA PARETE URTA LA
METÀ DELLE PARTICELLE
DELLA SCATOLA
($\frac{M}{2}$ INVECE DI M)

PROSE GUENDO

$$P = \frac{F}{A}$$

$$\text{PRESSIONE} = \frac{\text{FORZA}}{\text{AREA TRASVERSALE SU CUI VIENE ESERCITATA}}$$

a

$$A = a^2$$

$$P = \frac{1}{\frac{6}{3} a^2} \frac{2 \text{ m m} \langle \text{N}^2 \rangle}{a^2} = \frac{1}{3} \text{ m} \langle \text{N}^2 \rangle$$

MA $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = E_c$ ENERGIA
CINETICA
MOLECOLARE MEDIA

QUINDI CON UN PÒ
DI ALGEBRA

$$E_c = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{P}{\rho} = \frac{3}{2} \frac{m_{\text{mol}} R T}{m V} = \frac{3}{2} \frac{m_{\text{mol}} \cdot R T}{N}$$

N = NUMERO DI MOLECOLE

$$N = N_A \cdot M_{\text{mol}} \rightarrow \text{NUMERO DI MOLI}$$

↓
NUMERO DI MOLECOLE
IN UNA MOLE

$$E_c = \frac{3}{2} \frac{m_{\text{mol}} R T}{N_A \cdot M_{\text{mol}}}$$

$$\frac{R}{N_A} = k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

COSTANTE DI
BOLTZMANN

$$E_c = \frac{3}{2} k T$$

ENERGIA
CINETICA
MEDIA DI UNA
MOLECOLA

GRANDEZZA
RELATIVA LE
SINGOLE
MOLECOLE
(DINAMICA)

GRANDEZZA
MACROSCOPICA
(TERMODINAMICA)

La formazione di una stella dall'instabilità alla stabilità

Energia di un corpo soggetto alla gravità

Moto "libero" e moto "legato": considerazioni energetiche

$$E_{\text{tot}} = T + U$$

ENERGIA
MECCANICA
TOTALE

ENERGIA
CINETICA

ENERGIA
POTENZIALE

$$E = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{GMm}{r}$$

$E < 0$

MOTO "LEGATO"
(m È CATTURATO DA M)

$E \geq 0$

MOTO LIBERO
(m PUÒ ARRIVARE ALL'∞)

Perché cominci la contrazione gravitazionale di una massa gassosa (idrogeno) occorre che le sue particelle siano “legate” (cioè l'energia potenziale gravitazionale cominci a prevalere su quella termica)

Partiamo da un modello sferico (più facile da analizzare teoricamente per ovvie ragioni di simmetria) ...

/-----/

LIMITE MASSIMO DI ENERGIA PER UN
ATOMO DI H CATTURATO ; $E = 0$

$$(1) \quad E_{\text{tot}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} = \frac{3}{2} kT - \frac{GMm_p}{r} < 0$$

M = MASSA DELL'ADDENSAMENTO DI GAS CHE
TRATTIENE L'ATOMO DI IDROGENO

$$M = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho$$

$$r^3 = \frac{3}{4\pi} \frac{M}{\rho} \Rightarrow r = \left(\frac{3}{4\pi} \frac{M}{\rho} \right)^{1/3}$$

Un po' di calcoli ...

$$\frac{M}{r} = \left(\frac{4\pi e}{3} \right)^{1/3} M^{2/3}$$

SOSTITUENDO IN (1)

$$\frac{3}{2} kT \approx G m_p \left(\frac{4\pi e}{3} \right)^{1/3} M^{2/3}$$

$$M^{2/3} \approx \frac{3}{2} \frac{kT}{G m_p} \left(\frac{3}{4\pi e} \right)^{1/3}$$

$$M \gtrsim \left(\frac{3}{2} \frac{k}{G m_p} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \rho^{-1/2} T^{3/2}$$

MASSA MINIMA IN GRADO DI TENERE

LEGATO UN PROTONI

(DIMINUISCE CON IL CRESCERE DELLA DENSITA' ρ
DEL GAS; AUMENTA CON L'AUMENTARE DI T)

Calcoli fatti un po' in fretta. Rifateli con un po' più di calma ...

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{°K}} \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

$$m_p = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{kg}$$

$$M \gtrsim 0,7 \cdot 10^{21} \cdot \left(\frac{3}{2} \text{K} \right)^{3/2} \cdot \left(10^6 \text{m}^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)^{-1/2} \approx 10^{32} \text{kg} \approx 100 M_{\odot}$$

T. DELL'UNIVERSO
(RADIAZIONE COSMICA
DI FONDO)

DENSITA'
DEL
MEZZO
INTERSTELLARE
(1 PROTONI/cm³)

Ma il succo del discorso è questo:

nelle condizioni nella materia interstellare il limite minimo di massa per lo sviluppo di una instabilità gravitazionale (con conseguente contrazione) è molto superiore a quello di una singola stella.

Ciò spiega perché ammassi e sistemi multipli siano la regola, non un'eccezione per la popolazione stellare di una galassia.

Ammassi aperti più recenti
(di popolazione stellare di
disco, formatisi nei bracci a
spirale, cioè in condizioni di
densità superiore)

Ammassi globulari più
antichi (di popolazione
stellare di alone, formatisi
nei bracci a spirale, cioè in
condizioni di densità
inferiore)

Stabilità di una stella e Viriale

MOMENTO DI INERZIA =
GRANDEZZA CHE DEFINISCE
L'INERZIA ROTAZIONALE DI
UN SISTEMA, CIOÈ LA RESISTENZA
CHE OPpone AD ESSERE MESSO IN
ROTAZIONE.

Semplice applicazione del concetto di momento di inerzia

DISCO

ROTANTE

UGUALE ROTAZIONE

$$L = I \omega$$

STESSO
MOMENTO
ANGOLARE

PER UN DISCO
ROTANTE INTORNO
AL SUO ASSE

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

PER UN DISCO
 ROTANTE INTORNO
 AL SUO ASSE

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

DIPENDE DA :

(1) MASSA m_i

(2) ESTENSIONE, CIOÈ POSIZIONE
DELLE SUE COMPONENTI
ELEMENTARI, (r_i)

CIOÈ DIPENDE DA COM'È DISTRIBUITA

LA SUA MASSA DENTRO ALLO SPAZIO
CHE OCCUPA.

IN PRATICA

(2) PIÙ È MASSICCIO PIÙ
FAI FATICA A COMINCIARE A
FARLO GIRARE

(b) DI 2 DISCHI DI UGUALE
MASSA FACCIÒ PIÙ FATICA A METTERE
IN ROTAZIONE QUELLO CON IL RAGGIO
PIÙ GRANDE . . .

STABILITÀ DI
UN SISTEMA DI
PARTICELLE
(TEOREMA DEL VIRIALE)

$$\sum_{i=1}^N m_i r_i^2 = I \quad \left(\begin{array}{l} \text{MOMENTO DI} \\ \text{INERZIA} \end{array} \right)$$

↑ ↑
MASSE POSIZIONI

$$\frac{dI}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} = 2 \left[\sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)^2 + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \cdot \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \right]$$

v_i^2
VELOCITÀ²

$\vec{a}_i$
ACCELERAZIONI

PER IL II° PRINCIPIO DELLA DINAMICA

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{tot} = \sum_{j=1}^N \vec{F}_{ij}$$

FORZA
TOTALE
SU m_i

SOMMA DELLE FORZE
CHE TUTTI GLI ALTRI
CORPUSCOLI ESERCITANO
SU m_i

SOSTITUENDO
NELLA RELAZIONE PRECEDENTE
SI HA

$$\frac{d^2 \vec{I}}{dt^2} = \left[\sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{F}_{ij} \cdot \vec{r}_i \right]$$

MA POICHÉ LE FORZE CHE AGISCONO
 ALL'INTERNO DEL SISTEMA SONO
 LE ATTRAZIONI GRAVITAZIONALI
 RECIPROCHE, PER IL II°

PRINCIPIO DELLA DINAMICA

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

POSSIAMO SCRIVERE CHE

$$\frac{d^2 L}{dt^2} = 2 \left[\underbrace{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2}_{\text{ENERGIA CINETICA}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i > j}}^N \vec{F}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij}}_{\frac{G m_i m_j}{r_{ij}}} \right]$$

ENERGIA POTENZIALE
 DEL SISTEMA

E POICHÉ IL SISTEMA STELLARE
È STABILE :

ALLORA $\bar{I}$ DEVE RIMANERE

COSTANTE ... CIOÈ NON SOLO $\frac{d\bar{I}}{dt} = 0$

MA ANCHE

$$\frac{d^2 \bar{I}}{dt^2} = 0$$

E POICHÉ IL SISTEMA STELLARE
È STABILE :

ALLORA $\bar{I}$ DEVE RIMANERE

COSTANTE ... CIOÈ NON SOLO $\frac{d\bar{I}}{dt} = 0$

MA ANCHE

$$\frac{d^2 \bar{I}}{dt^2} = 0$$

Condizione di stabilità: la derivata temporale al secondo ordine deve essere nulla. Cioè la distribuzione di massa deve essere continuamente la stessa (le masse devono tenere le stesse posizioni reciproche costanti nel tempo).

QUINDI

$$2 E_{cin} + E_{pot} = 0$$

CONDIZIONE DI STABILITÀ
DI UN SISTEMA.

... oppure

$$2T + U = 0$$

Nella fase protostellare si passa dall'instabilità iniziale $E = T + U \leq 0$ alla condizione di stabilità $2T + U = 0$, cioè $E = T + U = -T$.

La nube in contrazione dissipa energia per irraggiamento: ciò rende conto delle emissioni infrarosse da parte degli oggetti protostellari.

QUANDO UNA STELLA
SI È FORMATA ENTRA
NEL

"DOMINIO DEL"
"VIRALE"

L'equilibrio idrostatico

- Equilibrio idrostatico: equilibrio tra la forza peso che agisce su di un elemento di materia gassosa della stella e le forze di pressione che agiscono su di esso

La forza di pressione che agisce su di un elemento di materia è determinata dalla presenza di un dislivello di pressione tra quella agente sulla faccia superiore e quella sulla faccia inferiore (gradiente di pressione).
Vediamo in dettaglio ...

ELEMENTO
INFINITESIMO

DI MASSA
GASSOSA

$$dm = \rho dV$$

SPINTA DI
ARCHIMEDE

PESO

+

$$F_p = \frac{G M_r \rho dV}{r^2}$$

PESO DELL'ELEMENTO DI
 MASSA dm

$$S_A = [p(r) - p(r+dr)] dS$$

SQUILIBRIO DI x AREA
 DI
 BASE
 DELL'ELEMENTO

$$dV = dr \cdot dS$$

VOLUME = ALTITUDA × BASE

$$\sum_A \vec{F}_p = 0$$

$$\left[-p(r+dr) + p(r) \right] dS - \frac{G M r \rho dr dS}{r^2} = 0$$

$$-\left[\frac{p(r+dr) - p(r)}{dr} \right] = \frac{G M_r \rho}{r^2}$$

DERIVATA
DELLA PRESSIONE
RISPETTO ALLA
DISTANZA DAL
CENTRO

$$\frac{dp}{dr} = - \frac{G M_r \rho}{r^2}$$

EQUAZIONE
DELL'EQUILIBRIO
IDROSTATICO.

DOVE M_r È LA MASSA CONTENUTA
ALL'INTERNO DELL'ELEMENTO DI GAS
(QUELLA ESTERNA NON PRODUCE)
CAMPO GRAVITAZIONALE

$$M_r = 4\pi \int_0^r \rho(x) x^2 dx$$

Memento: Campo gravitazionale generato da uno strato sferico di spessore infinitesimo

$2\pi R^2 \sin\theta d\theta = dS$
 σ DENSITA' SUPERFICIALE

$$g = \int_{M_{\text{tot}}} \frac{G dm}{r'^2} \cos\alpha = \int_{\text{SOP}} \frac{G \sigma \cos\alpha dS}{r'^2} = \dots$$

$r < R$
 $2\pi G \sigma R \frac{d}{dr} \left(1 + \frac{R}{r} - \frac{R}{r} + 1 \right)$
 $g = 2\pi G \sigma R \frac{d}{dr} (2) = 0$
 CAMPO NULLO
 ALL'INTERNO

$r > R$
 $2\pi G \sigma R \frac{d}{dr} \left(1 + \frac{R}{r} - 1 + \frac{R}{r} \right) =$
 $g = 2\pi G \sigma R \cdot \left(-\frac{2R}{r^2} \right) =$

$$g = -\frac{G [4\pi R^2 \sigma]}{r^2} = -\frac{GM}{r^2}$$

ALL'ESTERNO E' UGUALE A QUELLO DI UNA MASSA PUNTFORME NEL CENTRO.

Equazione di continuità della massa (chi ha mangiato i dolci che mancano?)

Non dobbiamo dimenticare che le stelle sono fatte di materia e che quest'ultima non si crea né si distrugge.

Vale a dire che se aumenta (o diminuisce) di un po' la sua quantità in un certo volume finito, è perché quel po' in più (o in meno) è entrato (o uscito) dalla superficie che lo racchiude.

E poiché ogni principio fisico deve avere la sua legge matematica ...

Proviamo a spiegare con un esempio pratico ...

ORE 8 : $N_0 = 10$

GIANDUOTTI

ORE 20 : $N_1 = 4$

"

VARIANZA

$$\Delta N = 4 - 10 = -6$$

INTERVALLO DI
TEMPO

$$\Delta t = 20 - 8 = 12 \text{ h}$$

VARIAZIONE DI QUANTITÀ
NELLE UNITÀ DI
TEMPO (ORA)

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{-6}{12} = -0,5$$

(QUANT. / h)

SE CE N'È DI
MENO QUALCUNO
LI AVRÀ TRAFUGATI!

$(\vec{J})$ FLUSSO TRASVERSALE USCENTE (< 0)

CHE ATTRAVERSA L'INVOLUCRO (SUPERFICIE CHIUSA)

... IDEALMENTE

CHIUSA!

$\rho(x) dA v(x) dt$
 QUANTITÀ DI
 MATERIA CHE
 ENTRA NEL TEMPO,
 dt

$\rho(x+dx) \cdot v(x+dx) dA dt$
 QUANTITÀ DI MATERIA
 CHE ESCE NEL
 TEMPO dt

$$dM = \rho(x) dA v(x) dt - \rho(x+dx) dA v(x+dx) dt$$

$$\frac{dM}{dt} = - \left[\rho(x+dx) v(x+dx) - \rho(x) v(x) \right] dA dx$$

$$\frac{1}{dA dx} \frac{dM}{dt} = - \frac{d(\rho v)}{dx}$$

$dA dx = dV$ (VOLUME TO INFINITESIMO)

$$\frac{dM}{dV} = \rho \text{ (DENSITA')}$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{\partial(\rho v)}{\partial x}}$$

(EQUAZIONE DI
CONTINUITA' IN
1 DIMENSIONE)

Equazione di continuità = equazione di conservazione della materia

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \vec{\nabla} \cdot \rho \vec{v}$$

(EQUAZIONE DI CONTINUITÀ IN 3D)

$$\vec{\nabla} \cdot \rho \vec{v} = \text{div}(\rho \vec{v}) = \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} + \frac{\partial \rho v_z}{\partial z}$$

NOTA

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

(CHIAMATO OPERATORE "DIVERGENTE")

Operatore differenziale “divergenza” (flusso attraverso una superficie chiusa)

FLUSSO
 TOTALE
 ATTRAVERSO
 LA SUPERFICIE
 CHIUSA

$$= [A_x(\Delta x) - A_x(0)] \Delta y \Delta z + \\
 + [A_y(\Delta y) - A_y(0)] \Delta x \Delta z + \\
 + [A_z(\Delta z) - A_z(0)] \Delta x \Delta y =$$

$$= \left(\frac{\Delta A_x}{\Delta x} + \frac{\Delta A_y}{\Delta y} + \frac{\Delta A_z}{\Delta z} \right) \cdot \overset{\Delta V}{\underbrace{\Delta x \Delta y \Delta z}}$$

IN FORMA DIFFERENZIALE

$$\int_{\text{SUPERFICIE}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{VOLUME}} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) \cdot dV$$

SUPERFICIE
ABCDEFGH

VOLUME

↓
DIVERGENZA
(OPERATORE DIFFERENZIALE)
DI "FLUSSO"

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} = 0$$

In pratica vuol dire che il cambiamento di densità all'interno di un dato volume, è legato al flusso entrante di materia entrante o uscente (ρv , prodotto della densità per la velocità di flusso).

Per oggi basta così valà ...