Associazione Astronomica del Rubicone

.....ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle....

Almizan II
 η Aql - 55 Aql - HIP 97804 - SAO 125159 - HD 187929 - HR 7570

Magnitudine: **3.85** (Estinta a: **4.03**)
AR/Dec (J2000.0): 19h52m28.39s/+1°00'20.2"

Rasalhague

L' A.A.R. presenta il

CORSO DI ASTRONOMIA DI BASE

Variabili - Il caso di η -Aquilae

di Carlo Canelli

Savignano sul Rubicone

08/02/2019

Un invito all'osservazione delle Stelle Variabili

(come arrivare all'osservazione di η Aql)

1- cosa è una stella variabile

2-tipologie

3-metodologie di osservazione

4- come ho osservato η Aql

5-risultati

6-bibliografia e siti

Tipi di stelle variabili

cosa succede su queste stelle ?

- Nebulari
 - Cefeidi
 - RR Lyrae
 - Ad eclisse
 - Cataclismiche
 - ...
 -
 - Ma cosa posso misurare ????
- Contrazione gravitazionale
 - Pulsanti F → G → K (1-100gg)
 - Pulsanti di breve periodo
 - Algol (β Persei)
 - Novae e supernovae

Posso osservare la luce

- Luminosità energia emessa al secondo
- Flusso energia emessa al secondo in arrivo su una certa superficie
- Stimo il flusso con la magnitudine apparente
- $L \rightarrow M \text{ assoluta} ; F \rightarrow m \text{ apparente}$
- **IMPORTANTE:** tra la luminosità e il flusso c'è di mezzo la distanza della sorgente

Da Ipparco a Pogson

- Ipparco di Nicea (II sec. a.C.) divide le stelle in 6 classi di luminosità
- Norman Robert Pogson (XIX sec.) formalizza quanto detto da Ipparco

$$m_V - m_{cfr} = -2,5 \cdot \log_{10} \left(\frac{F_V}{F_{cfr}} \right)$$

- La risposta dell'occhio agli stimoli luminosi è proprio logaritmica.

Stimo le magnitudini

- Magnitudine apparente: è quella che vedo
- Se la stella è una variabile la sua magnitudine (grandezza) cambia nel tempo
- Vega $m = 0,03$
- γ $m = 3,24$ (multipla)
- β $m = 3,45$ (var a eclisse)
- RR $P = 13,5$ ore ; $m \sim 7$

Cartina e foto

[https://it.wikipedia.org/wiki/Lira_\(costellazione\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Lira_(costellazione))

Se poi guardo i colori o meglio gli spettri

CLASSIFICAZIONE delle STELLE

Annie Jump Cannon
anni '20, '30

- Il colore è un'indicazione della temperatura superficiale
- Faccio un grafico con tipo spettrale e magnitudine
- Ottengo un diagramma di Hertzsprung e Russell (evoluzione delle stelle)

La vita di una stella

- Nel corso della sua vita una stella va a spasso per il diagramma H-R
- Nebulosa di gas e polveri in contrazione
- Accensione fusione nucleare $H \rightarrow He$
- Sequenza principale
- Instabilità
- Giganti rosse/azzurre
- Spegnimento o “strane cose”

Le variabili nel diagramma H-R

- Posizione delle variabili nel diagramma H-R
- Sono stelle in una fase instabile della loro vita
- La relazione Periodo – Luminosità per le cefeidi (H. Leavitt fine sec. XIX)
- periodo → luminosità → distanza !!!

Un esempio importante : le cefeidi (δ Cep)

- È una stella gialla gigante
- Tipo spettrale F – G
- Il cambio di magnitudine corrisponde a un cambio delle dimensioni della stella
- Ha lasciato la sequenza principale
- **IMPORTANTE:** Se ho la Luminosità posso ricavare la distanza !!!
- VIDEO dello space telescope inst!

La curva di luce

- Qualcosa di “facilmente” osservabile
- Seguendo la variazione di magnitudine di una stella ottengo la curva di luce
- Diverse curve di luce per diverse tipologie di stelle
- Notare le scale temporali

Esempi di curve di luce: si stanno osservando fenomeni fisici

Come si osserva una stella variabile

- Ti tocca star lì !
- Scelta della stella (disponibilità di tempo, strumentazione, seeing,....)
- Il metodo di stima della magnitudine
- Il sito AAVSO
- stellevariabili.uai.it
-

Come stimare la magnitudine

- Ci sono 3 metodi visuali molto simili:
 - frazionario
 - Argelander
 - Pogson
- Oppure stima diretta
- Tratto da *Il manuale delle stelle variabili* del G.R.A.V. pagina 11 e segg.
- l'Astronomia col binocolo cap. 8
- Tutorial AAVSO (in italiano!)

Il metodo frazionario ad esempio

1. Diciamo di avere una stella V da stimare e due stelle di confronto A (la più luminosa) e B (la meno luminosa)

2. Divido l'intervallo di magnitudini in un certo numero di parti

3. Stabilisco in che punto porre la mia V

4. Trovo M_V

- Esempio $M_A = 3,4$ e $M_B = 4,1$
- Penso di dividere in 5 parti l'intervallo $M_A - M_B$ come $M_A \mid \mid \mid \mid \mid M_B$
- Se stimo M_V 2/5 meno luminosa di A avrò:
- $M_V = M_A + 2/5 (M_B - M_A) = 3,4 + 2/5 \times 0,7 = 3,68$
- oppure, che è lo stesso,
 $M_V = M_B - 3/5 (M_B - M_A) = 4,1 - 3/5 \times 0,7 = 3,68$
- (esempio preso dal manuale GRAV: il segno!!!)

Il metodo di Argelander

- Metodo a gradini
- Gradini qualitativi: al solito almeno due stelle una più luminosa e l'altra meno luminosa della variabile
- Stimo la differenza →

$$M_V = M_A + \frac{g(AV)}{g(AV) + g(VB)} (M_B - M_A)$$

- 1 Gradino: quando le due stelle al primo colpo d'occhio sembrano uguali, e solo dopo un certo tempo ci si accorge che una è più luminosa dell'altra;
- 2 Gradini: quando le due stelle sembrano uguali al primo colpo d'occhio, ma quasi subito dopo si nota una differenza di luminosità;
- 3 Gradini: quando già al primo colpo d'occhio si nota una certa differenza;
- 4 Gradini: quando alla prima occhiata la differenza è ben evidente;
- 5 Gradini: quando si ha una notevole sproporzione di luminosità nella coppia in esame.

Il metodo di Pogson

- Ancora metodo a gradini
- Si dovrebbe arrivare a stimare differenze di 0,1- 0,2 magnitudini
- Quindi inadatto per principianti che ancora non hanno l'occhio !

Come nello start tutorial !

- Anche il metodo frazionario non mi è parso facile come sembra (il caso di η Orionis)
- Un confronto diretto come proposto dallo start tutorial dell'AAVSO a pag 6 può essere più soddisfacente da molti punti di vista (è rapido e allena l'occhio)
- In pratica è quello che ho usato per η aquilae

Due parole sul seeing

- Seeing ovvero trasparenza del cielo
- Cielo fotometrico ?!
- Stelle di confronto lontane dalla variabile che si studia
- Nubi, nebbia, foschia, il barbecue del vicino....
- La faccenda può essere complicata ma l'occhio è un ottimo strumento....

Il caso di η Aquilae

- Il primo tentativo, ottima per l'estate
- Sia occhio nudo che binocolo 10x50
- È nelle 10 stelle suggerite per cominciare
- Si riesce a fare !
- Dati stelle di confronto da *L'astronomia col binocolo* o sito internet (tanto per cominciare)
- Cefeide
- 4,1 – 5,4
- 7,2 giorni
- Declinazione tale da non far venire il torcicollo
- Osservata dal 30/7 al 30/8 nel 2011

η Aquilae

Stella di confronto	magnitudine
α	0,77
β	3,71
γ	2,72
δ	3,36
ϵ	4,0
ι	4,4
θ	3,24
ζ	3,0
λ	5,42

eta Aql

Magn: 3.49 - 4.30 V
 Period: 7.17679
 Type: DCEP
 Spec: F61b-G41b+B9.8V

ETA AQL
 (2000) 19:52:28.37 +01:00:20.4

AAVSO
 Chart
 X23658EU

FOV = 15.0°

Please use the photometry table for CCD observations.

η Aquilae

- Dati per le magnitudini ormai superati
- Stima diretta della magnitudine
- Mi interessava verificare se era una cosa fattibile
- Doveva saltare fuori questo: (da www.otticademaria.it)

η Aquilae

- Esempio di dati osservati
- Resistere alla tentazione di fare subito il grafico
- Prima i dati, poi il grafico
-

data	Magnitudine stimata	commenti
...		
31 luglio	4,0	Cielo pessimo usato binocolo
1 agosto	4,5	
2 agosto	4,1	
3 agosto	3,4	Cielo velato
4 agosto	3,45	
...		
21 agosto	4,2	Bellissima serata, visti oggetti in Sagittario
22 agosto	4,2	Come ieri
...		

η Aquilae

cosa è venuto fuori

—

cosa doveva essere

- $\Delta m = 4,5 - 3,4 = 1,1$
- $P \text{ medio} = 7,25 \text{ gg}$
-

- $\Delta m = 4,30 - 3,49 = 1,01$
- $P = 7,17679 \text{ gg}$
-

η Aquilae

considerazioni sui risultati

- 1) Risultato interessante vista la semplicità con cui ho affrontato l'osservazione;
- 2) Questo ne conferma la fattibilità anche per chi è senza esperienza;
- 3) Ottimo invito a proseguire.
- 4) Voto: 6/7

Per l'inverno

- η Orionis
- difficile: 3,60 – 3,31
- Periodo = 7,9 giorni
- $\Delta m = 0,29$

- δ Cephei
- 3,45 – 3,3 (per principianti ?)
- Periodo = 5 giorni
- $\Delta m = 0,15$

- ζ Geminorum
- Non facile: 4,18 – 3,62
- Periodo = 10,1 giorni
- $\Delta m = 0,56$

- η Geminorum
- Fattibile (per principianti)
- Periodo = 232 giorni !!!
- $\Delta m = 3,9 - 3,15 = 0,75$

Un esempio: δ Cephei ?

- Carta AAVSO; (lo starplotter, strumento indispensabile)
- Il 10startutorial e il manuale in italiano (studiare almeno un po')
- Identificare le stelle di confronto
- Prendere familiarità con la regione di cielo che interessa
- Perché non ho scelto δ Cep

Eta Orionis ?

- Limitata alla $M_v = 6.0$
- l'indicazione delle variabili +
- Le magnitudini di confronto
- I punti cardinali
- esempio concreto di uso dello starplotter
- <https://www.aavso.org/>
- Difficile per il piccolo range di magnitudine e le poche stelle di confronto adatte

Magari ζ geminorum

- Fare foto o stare al freddo ?
- dopotutto una foto è per gli occhi !
- Cefeide atipica: curva di luce simmetrica rispetto il max e talvolta una piccola gobba nella fase in salita
- Ma in inverno quante sere buone avrò ?

A proposito di ζ geminorum

- A fianco della spalla destra di Orione
- Chi riconosce la costellazione dei gemelli dalla mappa AAVSO ?
- Eppoi il meteo.... questo inverno al max ho avuto 12gg consecutivi !!!

È venuto fuori qualcosa ?

- Doh!
- Più o meno... (3,62 – 4,18)
- Alla prossima estate !

bibliografia

- www.aavso.org - materiale vario
- L' astronomia col binocolo, James Muirden – Longanesi 1977
- <https://almaak.wordpress.com/2017/02/27/il-cielo-ad-occhio-nudo-parte-6/>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_variabile
- <http://www.danielegasparri.com/>
- http://stellevariabili.uai.it/index.php/Sezione_Stelle_Variabili_UAI_-_GRAV_Gruppo_Ricerca_Astrofili_Variabilisti
- http://www.weasner.com/etx/ref_guides/aquila.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Cepheid_variable
- <http://www.astronomia-euganea.it/drupal/content/eppur-si-muove-sguardo-indiscreto-nella-vita-privata-delle-stelle>
- <http://sintiniobservatory.interfree.it/>
- http://stellevariabili.uai.it/index.php?title=Pagina_principale
- <http://www.stsci.edu/>

bibliografia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Cephei
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Mira_\(astronomia\)#Variabilit%C3%A0](https://it.wikipedia.org/wiki/Mira_(astronomia)#Variabilit%C3%A0)
- <http://quasar.teoth.it/forums/viewtopic.php?f=33&t=3458>
- <https://www.domusline.com/tecnologie/tecnologia/tecnologia-della-luce/1>
- <http://www.amastrofili.org/Doc/Articoli/2007/misurauniverso06.htm>
- https://www.popastro.com/main_spa1/guide-to-zeta-geminorum/
- <http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.txt>
- <http://www.stoccolmaaroma.it/2015/il-bosone-di-homer/>
- http://divulgazione.uai.it/images/AA_Magnitudini_stellari.pdf
- <https://earthsky.org/astronomy-essentials/what-is-stellar-magnitude>
- [https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/EAN_12\(2012\)a.pdf](https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/EAN_12(2012)a.pdf)

bibliografia

- <https://www.media.inaf.it/2018/07/31/ce-un-buco-nel-diagramma-hertzprung-russell/>
- <https://it.depositphotos.com/12250134/stock-illustration-hertzprung-russell-diagram.html>
- <https://startrekfederation.it/db.php?element=328>
- <http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/h/hertzprung-russell+diagram>
- <https://people.highline.edu/iglozman/classes/astronotes/stellarevolution.htm>
- <https://weheartit.com/entry/188128122>
-